

Impfkalender

(Standardimpfungen)

Alter	Schutzimpfung	Hinweis
ab 6 Wochen	Rotaviren	zwei bzw. drei Mal im Abstand von mind. vier Wochen
ab Beginn des 2. Monats	Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten), Tetanus (Wundstarrkrampf), Poliomyelitis (Kinderlähmung), Haemophilus influenzae Typ B, Hepatitis B (Gelbsucht) Pneumokokken	drei Mal im Abstand von vier Wochen; Kombinationsimpfstoffe verfügbar zwei Mal; mit zwei und vier Monaten (bei Frühgeborenen eine zusätzliche Impfung mit drei Monaten)
11. – 14. Monat	Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ B, Hepatitis B Pneumokokken Masern, Mumps, Röteln Varizellen (Windpocken)	vierte Impfung dritte Impfung (bei Frühgeborenen vierte Impfung) erste Impfung (MMR-Kombinationsimpfstoff) erste Immunisierung
ab 12. Monat	Meningokokken Typ C	eine Impfung
15. – 23. Monat	Masern, Mumps, Röteln, Varizellen	zweite Impfung entweder MMRV-Kombinationsimpfstoff oder Einzelimpfung MMR und Varizellen
5 – 6 Jahre	Tetanus, Diphtherie, Pertussis	Auffrischimpfung
9 – 17 Jahre	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis	Auffrischimpfung
9 – 14 Jahre	HPV (Humane Papillomviren)	zwei Impfungen im Abstand von mindestens fünf Monaten für Mädchen und Jungen
ab 18 Jahren	Masern	einmalig für alle nach 1970 Geborenen mit unklarem Immunschutz
18 – 60 Jahre	Diphtherie, Tetanus Pertussis	Auffrischimpfung jeweils zehn Jahre nach der letzten Impfung Auffrischimpfung einmalig in Kombination mit Diphtherie und Tetanus
ab 60 Jahren	Influenza Pneumokokken	jährlich Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Auffrischimpfung nur für bestimmte Indikationen empfohlen